

Dr J.B. LECA

Secrétariat
Tél. : 02 32 88 81 61
Fax. : 02 32 88 84 24
Chirurgie.Pédiatrique@chu-rouen.fr

Conseils de sortie pour les enfants opérés d'une cheilo-rhinoplastie secondaire par le Dr LECA

Votre enfant a bénéficié d'une cheiloplastie et d'une rhinoplastie secondaire (réparation de la lèvre et du nez). Voici quels sont les soins à poursuivre pendant **3 semaines** après l'intervention, afin d'obtenir une bonne cicatrisation.

ALIMENTATION

- . Privilégier une alimentation molle.

SOINS LOCAUX DE LA LEVRE

Après chaque repas:

- . Nettoyer la cicatrice avec du sérum physiologique ou à l'aide d'un brumisateur d'eau type Evian. Sauf si colle cutanée.
- . Bien sécher avec une compresse stérile en tamponnant sans frotter.
- . Si les lèvres sont sèches, vous pouvez appliquer une fine couche de pommade ophtalmique à la vitamine A, à renouveler si besoin.

SOINS LOCAUX DE LA NARINE

Avant chaque repas:

- . Pour les conformateurs, faire un lavage de nez à l'aide de sérum physiologique.

PARTICULARITES

- . Un bain de bouche doit être fait après chaque repas.
- . Un brossage de dents à l'aide d'une brosse à dents INAVA (7/100^{ème}) doit être fait matin et soir.
- . Votre enfant doit éviter de sucer son pouce ou sa main.
- . Le couchage de votre enfant sur le dos évite tout frottement du drap sur la lèvre.
- . L'arrêt scolaire est de 10 jours et l'arrêt de sport est de 2 mois.
- . Un rendez vous avec le chirurgien est prévu dans les 15 jours suivant la sortie.
- . **Ne pas oublier de donner les antibiotiques jusqu'à ce rendez-vous.**

Si problèmes, contacter le service d'hospitalisation ou Mme Fosse à la consultation de la clinique chirurgicale infantile au 02.32.88.01.76

Le 01/04/2014. **Dr LECA**