

## **Conseils de sortie pour les enfants ayant bénéficié d'une chéilo-septorhinoplastie secondaire**

Votre enfant a bénéficié d'une chéiloplastie et d'une septorhinoplastie secondaires (réparation de la lèvre et du nez). Un rendez-vous de contrôle est prévu 15 jours après l'intervention.

### **ALIMENTATION**

Privilégier une alimentation molle pendant trois semaines.

### **SOINS LOCAUX DE LA LÈVRE**

- Nettoyez la cicatrice avec de l'eau savonneuse une à deux fois par jour pendant 15 jours, **sauf s'il y a de la colle biologique.**
- Si les lèvres sont sèches, vous pouvez appliquer une fine couche de vaseline.

### **SOINS LOCAUX DE LA NARINE**

Avant chaque repas, faites un lavage de nez à l'aide de sérum physiologique. Les conformateurs sont à porter le plus longtemps possible, et au minimum **3 mois nuit et jour puis 6 mois toutes les nuits.**

### **SOINS DE BOUCHE**

- **Un bain de bouche doit être fait après chaque repas.**
- Un brossage de dents à l'aide d'une brosse à dents Inava 7/100 doit être fait matin et soir.

### **PARTICULARITÉS**

- Votre enfant doit éviter de porter des objets à sa bouche.
- Le couchage de votre enfant sur le dos évite tout frottement du drap sur la lèvre.
- L'arrêt scolaire est de 10 jours et l'arrêt de sport est d'un mois.
- **N'oubliez pas de donner les antibiotiques jusqu'au rendez-vous de contrôle.**

En cas de problème, contactez le service d'hospitalisation ou Mme Fosse à la consultation de la clinique chirurgicale infantile au 02 32 88 01 76.

Dr Leca