

Conseils de sortie pour les enfants opérés d'une gingivopériostoplastie avec greffe osseuse iliaque

Votre enfant vient de bénéficier d'une gingivopériostoplastie avec greffe osseuse iliaque. Voici quels sont **les soins à poursuivre pendant un mois**. Un rendez-vous de contrôle est prévu un mois après l'intervention.

Son alimentation doit être molle ou liquide et tiède. Évitez le pain, les biscuits secs et tout ce qui peut être irritant ou blessant pour la gencive.

Des bains de bouche sont à faire après chaque repas. Le brossage des dents du haut et du bas peut se faire dès la sortie d'hospitalisation à l'aide de la brosse à dents chirurgicale Inava 7/100.

Ne soulevez pas la lèvre supérieure. L'Élastoplast situé sur la lèvre doit rester en place si possible au moins une semaine. Lorsque vous le retirerez, faites-le en le tirant **vers le bas**.

N'oubliez pas de donner les antibiotiques pendant 10 jours.

Le pansement situé sur la hanche peut être retiré au bout de 48h. Les fils sont résorbables, il n'est pas nécessaire de les retirer.

La douche peut être prise dès l'ablation du pansement. Pas de bain avant deux semaines.

Il est nécessaire de surveiller la température pendant quelques jours après la sortie.

L'arrêt scolaire est de 10 jours.

L'arrêt de sport et de musique (flûte) est d'un mois.

En cas de problème, contactez le service d'hospitalisation ou Mme Fosse à la consultation de la clinique chirurgicale infantile au 02 32 88 01 76.

Dr Leca